


DeFAT SOLUTION

FACE & BODY




获得美国FDA认证

适用部位

双下巴
V-Line
蝴蝶袖
胸部赘肉
腰间赘肉
腹部脂肪
臀部及大腿赘肉
脂肪瘤

双重功效
直击脂肪不反弹



脂肪细胞颗粒大，
而且数量多



使用Fat Solution后，
大小及数量明显减少

开启

美


时代



10ml/via x 10ea



双重功效 直击脂肪



传统溶脂针

- ✓ 破坏脂肪细胞内组织结构，脂肪细胞大小被暂时缩小
- ✓ 根据饮食/药物等作用出现反弹

Fat Solution

- ◆ 破坏脂肪细胞膜，使其分解被吸收
- ◆ 脂肪细胞数量永远消失
- ◆ 脂肪细胞不会根据外界环境而再生



V紧轮廓

术后功效 抗炎重塑



- ◆ 抗炎反应：减少肿胀、红斑及疼痛
- ◆ 重塑效应：诱导纤维化及胶原蛋白产生，增加皮肤弹性



V提脸颊

DeFAT SOLUTION

DeFAT SOLUTION



V-line/
双下巴


用量用法

0.2ml-0.3ml
每点注射量

30G-31G/6mm
1ml注射器或胰岛素注射器

1.5cm-2cm
注射部位间隔

1注射2-3次
注射间隔4周，
根据情况增加次数



身体等
其他部位

用量用法

0.3ml-0.4ml
每点注射量


30G/11-13mm
1ml注射器

2cm
注射部位间隔

1注射3-4次
注射间隔4周，
根据情况增加次数


注意事项

- ◆ 施术前无需麻醉，可用冰敷10分钟/对痛症敏感的患者需用利多卡因麻醉处理
- ◆ 激光术同时进行，按照激光术->溶脂术的顺序。同时进行，应相应减少溶脂药物的用量
- ◆ 剩余药量妥善保管，可用于下次或其他患者使用
- ◆ 个人用量不同，过多使用不会造成不良反应
- ◆ 注射2-3天后可操作HIFU(超声刀)
- ◆ 注射7-10天后可操作超声、中低频等美容微整仪器
- ◆ 吸脂后可注射于该部位，使体内组织重组，改善凹陷，促进胶原蛋白的产生



Fat cell

Fat cell accumulates (hyperplasia, hypertrophy)



Injected FatX

To dissolve fat cell, microinjection of FatX to the targeted area



Inflamed Fat cell

The fat cell absorb FatX and become slightly inflamed then harden



Dissolving Fat cell

The hardened fat cell break down within a few weeks and excreted (Absorb with Acidity)


DeFAT SOLUTION 前后对比



42岁/男 施术2次



33岁/男 施术1次



35岁/女 施术1次



53岁/女 施术1次

DeFAT SOLUTION 前后对比



38岁/女 施术3次



30岁/女 施术4次



29岁/女 施术4次



39岁/女 施术3次

DeFAT SOLUTION 操作说明

面部	1) 各注射点间隔1.5~2cm
	2) 每个注射点注入0.2~0.3ml
	3) 使用30G~31G/6mm针头及1ml注射器即可。或1ml胰岛素注射器
身体	1) 各注射点间隔2cm
	2) 每个注射点注入0.3~0.4ml
	3) 使用30G/11~13mm针头及1ml注射器即可
	* 皮肤较厚的患者可选用更粗的针头
* 根据设计不同，各患者使用量略有不同。相比准确的用量，精准的设计与正确的层次注射更加重要	
* 需要注射在真皮层	
* 即便注入到其他层次或者注入量过多，由于脱氧胆酸（DCA)本来就是体内所含有的成分，因此无任何不良。为了维持体内平衡将被自然分解/排出体外。	
* 不需要进行麻醉，但对疼痛敏感的顾客可涂抹利多卡因后施术。一般冰敷10分钟后注射即可	
* 施术后，患者需要定期进行轻缓的按摩	
* 必要的时候，医生可给2-3天镇痛、抗生素等药物缓解	
* 注射5分钟后，是脂肪细胞开始破裂的过程，此时会伴随疼痛、灼热感及淤青等现象。严重程度个体差异存在不同（几天后症状消失）	
* 可以与激光术同时操作。需按照激光术->溶脂的顺序进行。如果同时进行激光操作，用量要比只进行溶脂操作时适当减少	